# Complesal 12-4-6

Adubo fluido composto NPK com micronutrientes para vinha, árvores de fruto, hortícolas, morangueiro, batata, cereais e ornamentais

**Formulação**
Solução aquosa com 120 g/l de azoto, 40 g/l fósforo e 60 g/l de potássio

**APV Nº**
Não tem

**Classificação Toxicológica**
Não tem

**Intervalo de Segurança**
Não tem

**Informações Detalhadas**

Propriedades »
Informações Complementares »
Embalagens »

**Preparação**
Calcule a dose a aplicar
Como preparar a Calda

**Dúvidas**
Dúvidas mais frequentes
Contacte os nossos técnicos

**Comprar**
Localize o distribuidor perto de si

*ATENÇÃO: A consulta deste site não dispensa a leitura atenta dos rótulos.Leia sempre os rótulos.*

## Propriedades

- **Complesal 12-4-6** é um adubo líquido para aplicação foliar ou através da água da rega.
- **Complesal 12-4-6** é um adubo com elevado teor de azoto para satisfazer as necessidades das plantas durante o período de crescimento (na fase de formação e crescimento dos frutos deverá usar Complesal 5-8-10).
- Isento de cloro.
- Todos os micronutrientes metálicos e magnésio encontram-se quelatados para melhor absorção.

## Condições de Aplicação

| Cultura | Problema | Conc. | Modo de Emprego |
|---|---|---|---|
| Alface | Carências Nutricionais | 250-500ml/hl | **Aplicação via foliar:** Aplicar desde o vingamento da plantação. 2 a 4 aplicações com intervalo entre aplicações de 1 a 2 semanas |
| Arroz | Carências Nutricionais | 9-10l/hl | Em mistura com a monda química que vier a efectuar-se. Nº aplicações: 1 a 2, com mais de 2 semanas de intervalo entre aplicações |
| Batateira | Carências Nutricionais | 1000ml/hl | **Aplicação via foliar:** desde 15-20 cm de altura até início da formação de tubérculos. Nº de aplicações: 1 |
| Cebola | Carências Nutricionais | 300-500ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar no início da formação do bolbo. Nº de aplicações: 1 a 2, com intervalo de 1 a 2 semanas entre aplicações. |
| Cenoura | Carências Nutricionais | 200-500ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar até à fase de formação da raiz tuberosa. Nº de aplicações: 1 a 2. |
| Citrinos | Carências Nutricionais | 500ml/hl | **Aplicação foliar:** aplicar antes da floração. Máximo de 3 aplicações, com 2 semanas de intervalo entre aplicações |
| Fruteiras | Carências Nutricionais | 250-300ml/hl | **Aplicação foliar:** 1 aplicação ao início da queda das pétalas nas prunóideas, e no fim da queda das pétalas em maçãs e pêras; 1 aplicação com os frutos vingados. |
| Hortícolas | Carências Nutricionais | 20-500ml/hl | **Aplicação no solo**: **REGAS DIÁRIAS**: **estufa**: 20-50 ml/hl; **viveiros**: 20-80 ml/hl; **campo**: 40-100 ml/hl.**REGAS SEMANAIS**: **estufa**: 100-300 ml/hl; **viveiros**: 100-400 ml/hl; **campo**: 200-500 ml/hl. |
| Meloeiro | Carências Nutricionais | 300-500ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar até ao aparecimento das primeira flores.Nº de aplicações: 1-2, com 2 semanas de intervalo entre aplicações |
| Morangueiro | Carências Nutricionais | 800ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar antes da 1ª floração de interesse, com Complesal 12-4-6 a 800 ml/hl, alternando com Complesal 5-8-10, 200 ml/hl, 1 aplicação. Após a 1ª floração de interesse aplicar mistura dos dois adubos em partes iguais, 4 a 6 aplicações, com 2 semanas de intervalo entre aplicações. |
| Oliveira | Carências Nutricionais | 600ml/hl | **Aplicação via foliar:**aplicar até antes da floração, 2 a 3 aplicações, com 2 semanas de intervalo entre aplicações. |
| Ornamentais | Carências Nutricionais | 20-500ml/hl | **Aplicação no solo:** Ornamentais geral:**REGAS DIÁRIAS: estufa**: 20-150 ml/hl; **campo**: 50-100 ml/hl. **REGAS SEMANAIS**: **estufa**: 100-500 ml/hl; **campo**: 200-400.<br>No campo,em azáleas, ericas, prímulas, espargo plumoso e antúrios, em regas diárias: 50-100 ml/hl, em regas semanais, 100-200 ml/hl.<br>Em ciclames, siningia, antúrios (Adreanum) e begóneas, em regas diárias, 50-100 ml/hl, e em regas semanais, 200-400 ml/hl. Em sanseviera, sardinheira, poinsetia, violetas-de-parma (Saintpaulias), Hortenses, monsteras (costelas-de-adão), em regas diárias, 50-100 ml; em regas semanais, 400-600 ml/hl. |
| Pepino | Carências Nutricionais | 300-500ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar até ao aparecimento das primeiras flores. Nº de aplicações. 1-2, com 2 semanas de intervalo entre aplicações |
| Pimenteiro | Carências Nutricionais | 500-800ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar antes da 1ª floração de interesse, nº de aplicações: 4-6, com 2 semanas de intervalo entre aplicações |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tomateiro | Carências Nutricionais | 500-800ml/hl | **Aplicação via foliar:** aplicar antes da 1ª floração de interesse, nº de aplicações: 4-6, com 2 semanas de intervalo entre aplicações |
| Videira | Carências Nutricionais | 200-300ml/hl | **Aplicação via foliar:** 1ª aplicação, 200 ml/hl quando a planta tiver as folhas livres; 2ª aplicação, 250 ml/hl com os cachos visíveis e a 3ª aplicação, 300 ml/hl no estado de bago de chumbo |

## Informações Complementares

- **Complesal 12-4-6** pode misturar-se em qualquer proporção com o adubo foliar Complesal 5-8-10, o que permite ajustar a composição do dubo e utilizar às necessidades e grau de desenvolvimento de cada cultura.
- Evitar aplicações no período da floração.

## Embalagens

- 1 l, 5 l, 25 l

© 2009 Bayer CropScience Portugal